ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/62 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	H8502-25G ; D1501-100MG ; P1537-10MG ; P9764-5UN ; P0883-10UN ; 198269-25G ; 14927-25MG ; BASMF2060-1KT ; BASMF2052-1EA ; BASMF2056-1EA	Sigma Aldrich	Հավաքածուն ներառում է՝ • Դոֆամին հիդրոքլորիդ, 25 գ. • Հորթի թիմուսի ԴՆԹ, 100 մգ. • Պոլի(rA)-պոլի(rU),10 մգ. • Պոլի(dA)-պոլի(dT),10 մգ. • Պոլի(dA-T)-պոլի(dA-T), • Էրիթրոզին- B, 25 գ. • Սերոտոնին, 25 մգ. • Էլեկտրոդի փայլեցման հավաքածու • Ag/AgCl (3M NaCl) համեմատական էլեկտրոդ, 1 հատ • Ag/AgCl (3M NaCl) համեմատական էլեկտրոդ, • Ag/AgCl (3M KCl) համեմատական էլեկտրոդ, 1 հատ Դոֆամինհիդրոքլորիդ 1տուփ=25գ Բանաձև՝ C8H11NO2 · HCl Մոլային զանգվածը՝ 189.64 գ/մոլ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2 - 8 °C Արտաքին տեսք (գույն) Սպիտակից դեղին գույնի երանգով Արտաքին տեսք (ձև) փոշի Մաքրություն (HPLC) > 97.5 % Լուծելիություն (գույն) -անգույնից մուգ դեղին և անգույն դեպի բաց շագանակագույն և դեղին-շագանակագույն Լուծելիություն (պղտորություն)- պարզից շատ թեթևակի մշուշոտ 400 մգ գումարած 4 մլ ջուր Ածխածնի պարունակությունը 49.7 – 51.7 % Ազոտի պարունակություն 7.2 - 7.5 % Ինֆրակարմիր սպեկտրը համապատասխանում է կառուցվածքին: Հորթի թիմուսի ԴՆԹ Լուծելիություն (գույն) Անգույնից թույլ դեղին Լուծելիություն

			(պղտորություն) Մաքուրից մինչև մշուշոտ 2 մգ/մլ H2O-ում Հարաբերակցությունը 260/280 նմ >1.8 _ A260 միավոր/մգ պինդ >16.0 _ Մեկ միավորը կբերի 1.0 A260 1.0 մլ 15 մՄ NaCl և 1.5 մՄ նատրիումի ցիտրատ, pH 7.0 (1 սմ լույսի ուղի): ԴՆԹ-ի մեկ մգ համարժեք է մոտ 20 A260 միավոր: Նատրիում (Na) 6 - 13 % Ֆոսֆոր (P) 5 - 9 % % սպիտակուց (ցածր) < 10 _ Համապատասխանություն Հարմար: Պոլի(rA)-պոլի(rU) 1տուփ=10մգ Արտաքին տեսք (ձև)- լիոֆիլացված փոշի Արտաքին տեսք (գույն)- սպիտակ Լուծելիություն (լուծիչ)- ջուր Լուծելիություն (կոնց) 9.80 - 10.20 մգ/մլ Լուծելիություն (պղտորություն)-պարզից մի փոքր մշուշոտ Լուծելիություն (գույն) -անգույն Մաքրություն (TLC) > 98,0 % _ Ուլտրամանուշակագույն (լուծիչ) PBS Ուլտրամանուշակագույն (Lambda max) 255 - 260 նմ A250/A260 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման կլանումը 0,76 - 0,96 A280/A260 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման կլանումը 0.40 - 0.50 A290/A260 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման կլանումը 0.04 - 0.14 Պահպանման ջերմաստիճանը (-15°C)- (-20 °C) Պոլի(dA)-պոլի(dT) 1տուփ=5 միավոր, 10 մգ Արտաքին տեսք (գույն) Սպիտակից բաց սպիտակ Արտաքին տեսք (ձև) փոշի A260 միավոր/մգ պինդ 10 - 30 Մեկ միավորը կբերի A260 1.0 1.0 մլ H2O-ում Պոլի(dA-T)-պոլի(dA-T) 1տուփ=10 միավոր Արտաքին տեսք (Գույն) Սպիտակ Արտաքին տեսք (ձև) փոշի A260 միավոր/մգ պինդ >12 Մեկ միավորը կբերի A260 1.0 1.0 մլ 20 մՄ նատրիումի ֆոսֆատ/100 մՄ NaCl, pH 7.0: Միջին երկարությունը բազային զույգերով >500 TLC համապատասխանում է (Ինքնությունը ստուգված է ֆոսֆոդիեստերազի հետ հիդրոլիզով) էրիթրոզին- B 1 հատ=25գ. վավերացված է կենսաբանական ներկերի հանձնաժողովի կողմից, ներկանյութի պարունակությունը ≥85% Արտաքին տեսք (ձև)՝ փոշի գնահատում՝ վավերացված կենսաբանական ներկերի հանձնաժողովի կողմից Որակի մակարդակ՝200-205 Բաղադրություն՝ Ներկի պարունակությունը, ≥85-87% Ալիքի երկարություն՝ 524-528նմ λմաքս.=525 նմ Հալման ջերմաստիճանը՝ 315-317 °C Լուծելիություն՝ ամբողջովին, H2O: 1 մգ/մլ ε (մարման

			գործակից)՝ ≥13000 308 -312 նմ ≥32000 259-263 նմ Կիրառություն՝ ախտորոշիչ վերլուծության արտադրություն արյունաբանություն հյուսվածաբանություն Սերոտոնին 1 տուփ=25մգ Բանաձև՝ C10H12N2O Մոլային զանգվածը՝ 176.22 գ/մոլ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2 – 8 °C գույն՝ Սպիտակից դեպի մուգ ձևը՝ Փոշի կամ բյուրեղներ Մաքրություն՝ > 95.0 % Ածխածնի պարունակությունը 68.16% Ջրածնի պարունակությունը 6.86% Ազոտի պարունակությունը 15.90% Պրոտոն ՄՄՌ սպեկտրը համապատասխանում է կառուցվածքին: Էլեկտրոդի փայլեցման հավաքածու Օքսիդավերականգնման ռեակցիաների արդյունավետությունը կախված է աշխատող էլեկտրոդի մակերևույթի վիճակից, Հավաքածուն պետք է ապահովի էլեկտրոդի մակերևույթի մաքրությունը: Հավաքածուն պետք է ներառի՝ Ալյումինե փայլեցնող բարձիկներ Էլեկտրոդի փայլեցնող ալյումինե սուսպենզիա (կախույթ): Ag/AgCl (3M NaCl) համեմատական էլեկտրոդ, Ag/AgCl (3M NaCl) տեղեկատու էլեկտրոդ՝ Ճկուն միակցմամբ Ag/AgCl (3M NaCl) համեմատական էլեկտրոդի ռեդոքս պոտենցիալը +0,209 Վ: Բարելավում է Ag/AgCl համեմատական հարթ էլեկտրոդների ֆիզիկաքիմիական և էլեկտրաքիմիական հատկությունները պոտենցիոմետրիկ տվիչներում ի հաշիվ գրաֆենի օքսիդի: Ag/AgCl (3M KCl) համեմատական էլեկտրոդ Ag/AgCl (3M KCl) համեմատական էլեկտրոդը հանդիսանում է էլեկտրաքիմիական սենսորային համակարգերի անբաժանելի մաս: Այն լայնորեն օգտագործվում է որպես ստանդարտ կալոմելի էլեկտրոդի (SCE) այլընտրանք, քանի որ այն շատ կայուն է և զերծ սնդիկից: Առկա է արտադրողի հավաստագիր: Հավաքածուն համապատասխանում է 1 հատին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			